

UNItears® fără conservanți

picături oftalmice, soluție, fără conservanți

1. Ce este UNItears fără conservanți și la ce se folosește

UNItears fără conservanți sunt picături oftalmice cu hipromeloză și dexpan-tenol. Au efect protector, epitelizant și umidifiant. Hipromeloză creează la suprafața ochiului un film protector temporar, prin care umidifică suprafața externă a ochiului și oferă alternativă în cazul secreției lacrimale insuficiente. Îndepărtează senzația de "ochi uscat". Induce relaxare rapidă în cazul iritațiilor minore ale ochiului de origine non-infecțioasă. Prezența dexpan-tenolului (vitamina B5) contribuie la regenerarea rapidă a celulelor la suprafața corneei (epitelizare).

UNItears fără conservanți nu conține conservanți, de aceea este produsul ideal pentru purtătorii de lentile de contact și persoanele cu ochii sensibili.

UNItears fără conservanți ameliorează pe termen lung:

- Insuficiența lacrimală, sindromul de ochi uscat (keratoconjunctivitis sicca)
- Rănirea sau eroziunea corneei
- După chirurgia oculară
- Senzații de disconfort (arsură, mâncărime, corp străin), asociate cu factori externi (climatizare, vânt, praf, fum)
- Oboseala oculară (datorată utilizării îndelungate a calculatorului) și îngreunării vederii în timpul zilei
- Purtarea lentilelor de contact

UNItears fără conservanți se poate administra adulților, adolescenților și copiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte de a folosi UNItears fără conservanți

Nu folosiți UNItears fără conservanți:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele produsului
- în faza acută a unei eroziuni a ochiului, până la îndepărtarea totală din sacul conjunctival a substanței iritante și a țesutului alterat.
- simultan cu produsele oftalmice care conțin săruri de metale

Dacă se aplică simultan și alte picături sau geluri oftalmice, este recomandat să se mențină un interval de minim 5 minute între aplicări.

3. Cum se folosește UNItears fără conservanți:


Doza recomandată este de o picătură de 2-3 ori pe zi. Poate fi aplicat și mai frecvent. UNItears fără conservanți poate fi folosit pe termen lung.

Avertisment

După aplicarea acestui produs este posibil să apară o tranzitorie ușoară senzație de arsură sau vedere înceteșată. Așteptați până vederea revine la normal înainte de a conduce autovehicule sau opera mașini.

Precauții înaintea administrării


1. Spălați-vă pe mâini și așezați-vă într-o poziție confortabilă.
2. Desfaceți capacul flaconului.



3. Țineți flaconul între degetul mare și celelalte degete, cu picurătorul în jos.
4. Înainte de prima utilizare, este recomandat ca prin presarea ușoară a flaconului să eliberați prima picătură în exteriorul ochiului. Apăsarea puternică și neconsecventă poate cauza eliberarea unui jet de soluție.
5. Folosiți degetul pentru a trage în jos de pleoapa inferioară a ochiului



6. Plasați vârful picurătorului aproape de ochi, dar fără a atinge ochiul sau regiunile adiacente ochiului.
7. Apăsati ușor pe flacon, astfel încât o singură picătură să ajungă în ochi. Pentru următoarea picătură, permiteți flaconului să tragă aer pentru a reveni la forma inițială, apoi continuați aplicarea așa cum v-a fost recomandat. Luați în considerare că este posibil să dureze câteva secunde din momentul când apăsați pe flacon până iese prima picătură. Flaconul nu trebuie apăsat prea tare.



8. Dacă este nevoie, repetați procedura și pentru al doilea ochi.



9. După utilizare, flaconul trebuie scuturat o dată în jos, fără a atinge vârful picurătorului, pentru a îndepărta lichidul rămas pe vârf. Această acțiune este necesară pentru a asigura sterilitatea soluției și o eliberare mai ușoară a picăturilor la următoarea utilizare.
10. Imediat după utilizare, închideți bine capacul flaconului.

4. Posibile efecte secundare

Rareori, imediat după aplicare, poate să apară o senzație temporară de arsură ușoară sau o reacție de hipersensibilitate la unul din componentele produsului, sau o lipire temporară a genelor.

În cazul apariției acestor efecte adverse sau altor reacții neobișnuite, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Purtătorii de lentile de contact

UNItears fără conservanți se poate aplica în timpul purtării lentilelor de contact.

5. Ce conține UNItears fără conservanți

Hipromeloza 5 mg/ml, dexpantenol, clorură de sodiu, edetat disodic dihidrat, apă purificată.

6. Cum se păstrează UNItears fără conservanți și alte informații

Păstrați produsul în ambalajul original la temperaturi până la 25 °C.

Nu depozitați în frigider. Nu congelați.

Nu lăsați la îndemâna și vederea copiilor.

Produsul nu trebuie utilizat după data de expirare înscrisă pe etichetă sau ambalaj în dreptul semnelui clepsidrei. Data expirării se referă la ultima zi din luna respectivă.

Nu folosiți mai mult de 3 luni de la prima deschidere a flaconului.

Ambalaj: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovacia

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Ultima actualizare a prospectului: Aprilie 2020.



Orišková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika

